



Česká urologická společnost ČLS JEP

# Bulletin



číslo **3** | 2022

 **Urizia**<sup>TM</sup>  
solifenacini succinas /  
tamsulosini hydrochloridum



Lék pro pacienty s LUTS/BPH, kteří adekvátně nereagují na léčbu monoterapií.<sup>1</sup>

V této publikaci naleznete zkrácenou informaci o léčivém přípravku Urizia na následující straně.

 **astellas**

Reference: 1. SmPC Urizia, datum revize textu 1. 2. 2019.

**ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU. Urizia** (solifenacin succinas / tamsulosini hydrochloridum). **Složení:** Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje vrstvu solifenacinu succinas 6 mg (odp. solifenacinum 4,5 mg) a vrstvu tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg (odp. tamsulosinum 0,37 mg). **Terapeutické indikace:** Léčba středně těžkých až těžkých jímacích symptomů (urgence, zvýšená frekvence močení) a mikčních symptomů spojených s benigní hyperplazií prostaty (BPH) u mužů, kteří adekvátně nereagují na léčbu monoterapií. **Dávkování a způsob podání:** Dospělí muži (včetně starších) jedna tableta jednou denně, spolu s jídlem nebo nezávisle na jídle. Tabletu polykat celou neporušenou, bez kousání, žvýkání, drčení. Je třeba opatrnosti u těžké poruchy funkce ledvin a středně těžké poruchy funkce jater. S opatrností u pacientů současně léčených středně nebo vysoce účinnými inhibitory CYP3A4, např. verapamil, zyklokapron, ritonavir, neflavinir, itraconazol. **Pediatrická populace:** Žádná relevantní indikace k použití přípravku Urizia u dětí a dospívajících. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku. Pacienti podstupující hemodialýzu. Těžká porucha funkce jater. Těžká porucha funkce ledvin a současná léčba vysoce účinným inhibitorem cytochromu P450 (CYP) 3A4, např. ketokonazolem. Středně těžká porucha funkce jater a současná léčba vysoce účinným inhibitorem CYP3A4, např. ketokonazolem. Závažné gastrointestinální poruchy (včetně toxického megakolonu), myasthenia gravis, glaukom s úzkým úhlem a pacienti s rizikem těchto onemocnění. Anamnéza ortostatické hypotenze. **Zvláštní upozornění a opatření pro použití:** Používání s opatrností u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin, rizikem retence moči, gastrointestinálními obstrukčními poruchami, rizikem snížení gastrointestinální motility, hiátovou hernií/gastroezofageálním refluxem nebo ti kteří současně užívají přípravky (jako bifosfonáty), které mohou vyvolat nebo zhoršit ezofagitidu; autonomní neuropatií. Pacient má být pečlivě vyšetřen s cílem vyloučit ostatní onemocnění, jejichž symptomy mohou být shodné s příznaky benigní hyperplazie prostaty. Před zahájením léčby přípravkem Urizia mají být posouzeny jiné možné příčiny častého močení (srdeční selhání nebo onemocnění ledvin). Je-li přítomna infekce močových cest, má být zahájena odpovídající antibakteriální léčba. U pacientů s rizikovými faktory, jako jsou předcházející výskyt syndromu dlouhé QT intervalu a hypokalemie, kteří jsou léčeni solifenacin sukcinátem, bylo pozorováno prodloužení QT intervalu a výskyt Torsade de pointes. U pacientů, kteří užívají solifenacin sukcinát a tamsulosin, byl hlášen výskyt angioedému s obstrukcí dýchacích cest. Pokud dojde k výskytu angioedému, podávání přípravku Urizia má být okamžitě ukončeno a nemá být znovu zahajováno. Má být zavedena příslušná léčba a/nebo jiná opatření. U některých pacientů užívajících solifenacin sukcinát, byla hlášena anafylaktická reakce. U pacientů, u kterých dojde k anafylaktické reakci, musí být podávání přípravku Urizia okamžitě ukončeno a má být zavedena příslušná léčba a/nebo jiná opatření. Stejně jako u jiných antagonistů  $\alpha$ -1-adrenoreceptorů může při léčbě tamsulosinem dojít v jednotlivých případech k poklesu krevního tlaku a v důsledku toho může ve vzácných případech dojít ke mdlobě. Pacienti, kteří zahájí léčbu přípravkem Urizia, mají být upozorněni, aby si při prvních příznacích ortostatické hypotenze (závrat, slabost) sedli nebo lehli, dokud tyto příznaky neodezní. Peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFS – Intraoperative Floppy Iris Syndrome, varianta syndromu malé zornice) byl pozorován během operací katarakty a glaukomu u některých pacientů současně či v minulosti léčených tamsulosin hydrochloridem. IFS může zvýšit riziko očních komplikací během operace a po operaci. Zahajování léčby přípravkem Urizia u pacientů plánovaných k operaci katarakty nebo glaukomu se nedoporučuje. Přerušení léčby přípravkem Urizia 1-2 týdny před operací katarakty nebo glaukomu je považováno za užitečné, nicméně skutečný přínos tohoto přerušení nebyl stanoven. Během předoperační rozvahy mají oční specialisté vzít v úvahu, zda pacient indikovaný k operaci katarakty nebo glaukomu je nebo byl léčen přípravkem Urizia, aby byla zajištěna příslušná opatření k případnému zvládnutí IFS během operace. Přípravek Urizia má být používán s opatrností v kombinaci se středně a vysoce účinnými inhibitory CYP3A4 (viz bod 4.5) a neměl by být používán v kombinaci s vysoce účinnými inhibitory CYP3A4, např. ketokonazolem, u pacientů se slabým metabolickým fenotypem CYP2D6 nebo těch, kteří užívají vysoce účinné inhibitory CYP2D6, např. paroxetin. **Interakce:** Současné podávání s jinými přípravky s anticholinergními vlastnostmi může mít za následek výraznější léčebný účinek i nežádoucí účinky. Mezi ukončením léčby Urizí a zahájením jiné anticholinergní terapie nutná přestávka 1 týden. **Interakce s inhibitory CYP3A4, CYP2D6:** Solifenacin může snižovat účinek léčivých přípravků stimulujících motilitu gastrointestinálního traktu (metoklopramid, cisaprid). Současné podávání tamsulosinu s jiným antagonistou  $\alpha$ -1-adrenoreceptorů může snižovat krevní tlak. Diklofenak a warfarin mohou zvýšit rychlost eliminace tamsulosinu. Současné podávání s furosemidem způsobuje pokles plazmatických hladin tamsulosinu, ale pokud hladiny zůstanou v normálním rozmezí, je souběžné použití přípustné. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Vliv na fertilitu nebyl stanoven. Přípravek Urizia není určen k použití u žen. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Pacienti mají být informováni o možném výskytu závratě, rozmazaného vidění, únavy a méně často ospalosti. **Nežádoucí účinky:** *Shrnutí bezpečnostního profilu:* Urizia může způsobit anticholinergní nežádoucí účinky obecně mírné až střední závažnosti. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky u klinických studiích provedených při vývoji přípravku Urizia bylo sucho v ústech (9,5%), následuje zácpa (3,2%) a dyspepsie (včetně bolesti břicha, 2,4%). Další časté nežádoucí účinky jsou závratě (včetně vertiga, 1,4%), rozmazané vidění (1,2%), únava (1,2%) a poruchy ejakulace (včetně retrográdní ejakulace, 1,5%). Nejzávažnější nežádoucí účinek, který byl pozorován v klinických studiích při léčbě přípravkem Urizia, je akutní retence moči (0,3%, méně časté). Souhrn nežádoucích účinků: „Četnost Urizia“ odráží nežádoucí účinky pozorované během dvojitě zaslepených klinických studií provedených při vývoji přípravku Urizia (na základě hlášení nežádoucích účinků souvisejících s léčbou, které byly hlášeny nejméně dvěma pacienty a jejichž četnost výskytu byla vyšší než u placeba ve dvojitě zaslepených studiích). „Četnost solifenacin“ a „četnost tamsulosin“ odráží nežádoucí účinky dříve hlášené u jedné z jednotlivých složek (jak je uvedeno v souhrnu údajů o přípravku (SPC) solifenacinu 5 a 10 mg a tamsulosinu 0,4 mg), které mohou nastat při užívání přípravku Urizia (některé z nich nebyly během programu klinického vývoje přípravku Urizia pozorovány). **Infekce a infestace: Infekce močových cest:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Cystitida:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Poruchy imunitního systému: Anafylaktická reakce:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Poruchy metabolismu a výživy: Snížená chuť k jídlu:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Hyperkalemie:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Psychiatrické poruchy: Halucinace:** Velmi vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Stav zmatenosti:** Velmi vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Delirium:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Poruchy nervového systému: Závratě:** Časté (u přípravku Urizia); **Vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); Somnolence:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Dysgeuzie:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Bolest hlavy:** Vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Synkopa:** Vzácné (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>). **Poruchy oka: Rozmazané vidění:** Časté (u přípravku Urizia); Časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). Není známo (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Peroperační syndrom plovoucí duhovky (IFS):** Není známo\*\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>). **Suché oči:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Glaukom:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Postižení zraku:** Není známo\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>). **Srdeční poruchy: Palpitace:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Torsade de pointes:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Prodloužení QT intervalu na EKG:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Fibrilace síní:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Není známo\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Arytmie:** Není známo\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Tachykardie:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Není známo\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>). **Čévní poruchy: Ortostatická hypotenze:** Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: Řinotida:** Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Sucho v nose:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Dyspnoe:** Není známo\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Dysfonie:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Epistaxe:** Není známo\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>). **Gastrointestinální poruchy: Sucho v ústech:** Časté (u přípravku Urizia); Velmi časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Dyspepsie:** Časté (u přípravku Urizia); Časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Zácpa:** Časté (u přípravku Urizia); Časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Nauzea:** Časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Bolest břicha:** Časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Refluxní choroba jícnu:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Průjem:** Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Sucho v krku:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Zvracení:** Vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Obstrukce tlustého střeva:** Vzácné (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Fekální impakce:** Vzácné (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Ileus:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Břišní diskomfort:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Poruchy jater a žlučových cest: Poruchy jater:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Abnormální výsledky jaterních testů:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Poruchy kůže a podkožní tkáně: Pruritus:** Méně časté (u přípravku Urizia); **Vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); Kopřivka:** Velmi vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Angioedém:** Velmi vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Vzácné (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); Stevens-Johnsonův syndrom:** Velmi vzácné (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Erythema multiforme:** Velmi vzácné\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Není známo\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Exfoliativní dermatitida:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). Není známo\* (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>). **Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně: Svalová slabost:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Poruchy ledvin a močových cest: Retence moči\*\*\*:** Méně časté (u přípravku Urizia); **Vzácné (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); Obtížné močení:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Porucha funkce ledvin:** Není známo\* (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>). **Poruchy reprodukčního systému a prsu: Poruchy ejakulace včetně retrográdní ejakulace a selhání ejakulace:** Časté (u přípravku Urizia); Časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>); **Priapismus:** Velmi vzácné (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>). **Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: Únava:** Časté (u přípravku Urizia); Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Periferní edém:** Méně časté (Solifenacin 5 mg a 10 mg<sup>†</sup>); **Astenie:** Méně časté (Tamsulosin 0,4 mg<sup>†</sup>). <sup>†</sup>(Nežádoucí účinky (NU) solifenacinu a tamsulosinu uvedené výše jsou NU uvedené v SmPC obou přípravků. \*Zaznamenáno po uvedení přípravku na trh. Protože tyto spontánně hlášené účinky jsou z celosvětových post-marketingových zkušeností, četnost těchto účinků a úlohu solifenacinu nebo tamsulosinu a jejich příčinných souvislostí nelze spolehlivě určit. \*\*Zaznamenáno po uvedení přípravku na trh, pozorované během operace katarakty a glaukomu. \*\*\*viz Zvláštní upozornění a opatření pro použití.) **Dlouhodobá bezpečnost přípravku Urizia:** Profil nežádoucích účinků pozorovaných při léčbě až do 1 roku byl podobný jako u 12týdenních studií. Přípravek je dobře snášen a s dlouhodobým užíváním nebyly spojeny žádné zvláštní nežádoucí účinky. **Popis vybraných nežádoucích účinků:** Pro retenci moči viz Zvláštní upozornění a opatření pro použití. **Starší populace:** Terapeutická indikace přípravku Urizia, středně těžké a těžké příznaky zadržování moči (urgence, zvýšená frekvence močení) a příznaky obtížného močení spojeného s BPH, je onemocnění postihující starší muže. Klinický vývoj přípravku Urizia byl proveden u pacientů ve věku 45 až 91 let, přičemž věkový průměr činil 65 let. Nežádoucí účinky u starší populace byly podobné jako u mladší populace. **Hlášení podezření na nežádoucí účinky:** Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek). **Uchovávání:** Žádné zvláštní podmínky. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Astellas Pharma s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika. **Registrační číslo:** 73/439/13-C. **Datum revize textu:** 1. 2. 2019.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Podmínky úhrady naleznete na [www.sukl.cz](http://www.sukl.cz)

Astellas Pharma s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel. +420 221 401 500 [www.astellas.com](http://www.astellas.com)

Kód materiálu: VESOM\_2022\_0007\_CZ | Datum přípravy: 01/2022



# Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, věřím, že jste prožili klidné léto, pro většinu čas dovolených a kýženého odpočinku. Těší mne, že po dlouhé době nemusím do textu míchat hořekování nad pandemickou situací a pevně doufám, že i do budoucna se toto téma opět nestane hlavním titulkem každodenních zpráv.

Rád bych připomněl, že i v nelehkých časech pokračuje systematické vzdělávání rezidentů, kteří měli možnost se účastnit všech plánovaných kurzů, i když někdy vzhledem k nepříznivé situaci v distanční formě. V řádných termínech probíhají i kmenové zkoušky na jednotlivých fakultách a zkoušky atestační, jejichž konání zajišťuje vždy jedna z osmi lékařských fakult a to dle přesného plánu rotace. Červnové atestace tak proběhly se stoprocentní úspěšností rezidentů na 2. LF UK

v pražském Motole a prosincové atestace se chystají na LF OU a FN v Ostravě. Dle obdobného plánu rotace se každým rokem stává zástupce jedné z fakult předsedou Specializační oborové rady pro obor Urologie (SOR). To je koordinační orgán složený z garantů oboru Urologie jednotlivých fakult – ti jsou jmenováni příslušnými děkany. SOR připravuje na každý rok plán specializačního vzdělávání – místa a termíny konání kurzů základního kmene, specializačních atestačních kurzů a atestací. SOR úzce spolupracuje s Koordinační radou pro specializační vzdělávání (KOR), která je tvořena většinou proděkany fakult a zabezpečuje spolupráci mezi samotnými univerzitami a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Tento krátký vhled do organizace specializačního vzdělávání by měla doplňovat i informace o tvorbě vlastního vzdělávacího programu. Ten ve formě zákonné normy, zveřejněné ve Věstníku MZ ČR, určuje Akreditační komise pro obor Urologie (AK), jejíž členy jmenuje ministr zdravotnictví dle návrhu ministerstva, odborných společností, lékařských fakult a České lékařské komory.

Proces tvorby, aktualizace, plánování, realizace, dohledu a hodnocení specializační přípravy v našem oboru je tedy nadmíru komplexní a organizovaný. Nicméně v každé jeho fázi je nesmírně důležité brát v potaz názory samotných rezidentů. Je potěšující, že rezidenti v našem oboru jsou sdružení ve vlastní organizaci, jejíž zástupci jsou pravidelně zváni na důležitá jednání orgánů České urologické společnosti. Tato zvyklost není v ostatních oborech samozřejmostí. Měli bychom si proto těchto podstatných a inspirativních vztahů vážit, pečovat o ně a do budoucna je rozvíjet.



doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

člen výboru ČUS ČLS JEP

# Aktuality ze společnosti

## Zápisy ze schůzí výboru ČUS

Na webových stránkách ČUS je publikován zápis z červnové schůze výboru ČUS | [ZDE](#) |.

## Noví členové České urologické společnosti

Výbor ČUS schválil 15. června přijetí nových členů společnosti:



MUDr. Kristýna Bigasová

Urologické oddělení  
Nemocnice Most



MUDr. Zuzana Dohnalová

Urologické oddělení  
Nemocnice Jihlava



MUDr. Eva Kršáková

Urologická klinika FN Brno

## Atestační zkoušky

Atestací na 2. LF UK v Praze v Motole se v termínu 17. června 2022 účastnilo šest rezidentů – MUDr. Bartáková Lucie, MUDr. Štrajtová Iveta, MUDr. Šlemendová Monika, MUDr. Sedláčková Hana, Ph.D., MUDr. Šachová Šárka a MUDr. Vlnieška Jan.

Všichni atestovaní prokázali velmi dobrou úroveň teoretické připravenosti a s veškerými náležitostmi úspěšně složili specializační zkoušku v oboru Urologie.

Zimní atestace se uskuteční **8. – 9. prosince 2022 na půdě LF OU FN Ostrava.**

doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.



Členové atestační komise (zleva) prim. MUDr. Jan Schraml, Ph.D., MUDr. Antonín Brisuda, Ph.D., prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. a prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA společně s úspěšnými uchazečkami o atestační zkoušku.

## 10. Urologický video-seminář

**23. a 24. září proběhne v Hradci Králové už 10. ročník video-semináře**, který organizuje Urologická klinika FN Hradec Králové.

### Témata letošního video-semináře:

- Prezentace operační zkušenosti, nápady, inovace, které pomáhají při náročných urologických operacích.
- Prezentace videí robotické chirurgie v urologii.
- Dalším okruhem jsou komplikace, případně jiné neočekávané události při operacích a metody jak je zvládnout.

Hlavním cílem jsou praktické zkušenosti z urologické operativy, indikace k výkonům, řešení komplikací apod.

Součástí semináře bude možnost hands-on trainingu na trenažéru pro robotickou operativu společnosti Intuitive a laparoskopickou operativu společnosti Virtamed.

## 10. ročník Video-semináře Urologické kliniky FN a LF UK Hradec Králové

Pořádá Urologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové ve spolupráci se společností Forsapi kongres s.r.o.

### Vědecký výbor:

prof. MUDr. Miloš Brodák, Ph.D.,  
prim. MUDr. Josef Košina,  
MUDr. Michal Balík

### Odborný garant:

prof. MUDr. Miloš Brodák, Ph.D.,  
pracoviště: Urologická klinika FNHK,  
Sokolská 581, 50005 Hradec Králové



Výukové centrum FN a LF UK HK

**23. 9. 2022** od 9:00 h

Diskusní večer **22. 9. 2022** od 18:00 h

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Vzdělávací akce je ohodnocena kredity.

### Témata letošního Video-semináře jsou:

- Typy a triky urologické operativy
- Operační komplikace a jejich řešení

**300 Kč registrační poplatek** zahrnuje účast na přednáškách, **občerstvení** během celého semináře.

**Registrace:** <https://forsapikongres.cz/akce/10-rocnik-video-seminare-urologicke-kliniky-fn-hradec-kralove/>

### Kontakt na organizátory:

**Forsapi kongres s.r.o.**  
Rasošky 82, 55221 Rasošky, ČR  
Tel.: +420 602 372 712  
E-mail: [info@forsapikongres.cz](mailto:info@forsapikongres.cz)

Přihlášku k aktivní účasti zašlete prosím do **31. 7. 2022** na e-mail: [info@forsapikongres.cz](mailto:info@forsapikongres.cz).

## 33. setkání dětských urologů a nefrologů

Pediatrická sekce ČUS bude **7. – 8. října** na Vysočině pořádat tradiční setkání dětských urologů a nefrologů. Odborným garantem akce bude MUDr. Jan Trachta.

### 33. výroční setkání dětských urologů a nefrologů

7. a 8. října 2022

Orea Resort Devět Skal, Vysočina



Vážení kolegové a kolegyně, vážení přátelé!

Dovoľte mi, abych vás jménem urologické skupiny Kliniky dětské chirurgie FN Motol pozval na 33. výroční setkání dětských urologů a nefrologů z Čech a Slovenska u termínu 7. a 8. října 2022.

**Tématem letošní konference jsou hypospadie a rekonstrukční urologické operace plus varia.**

Letošní konferenci bez roušek pořádně v přírodě u vody, kam z radosti nad ústupem COVID pandemie, můžete po půlnoci skočit a osvěžit své hlavy znavené odborným programem. Abychom nebyli nařčeni z pragocentrismu, vybrali jsme komfortní wellness resort na neutrální půdě Vysočiny, kam lze dojet i z Moravy. Velmi si vážíme jak vzájemných přátelských vztahů mezi dětskými urology z Čech a Slovenska, tak vztahů s dětskými nefrology, bez jejichž úzké spolupráce se v každodenní praxi neobejdeme.

Věříme, že toto odborné setkání zjednoduší sdílenou péči o dětské pacienty napříč oběma republikami.

Přijedte se v říjnu pobavit do Devíti Skal!

Srdečně zdraví,

Honza Trachta



### Organizační informace

**Termín konání:** 7. – 8. 10. 2022

**Místo konání:** OREA Resort Devět Skal, Šněžné - Milovy 11, 592 02 Svatka

**Termín uzávěrky příjmu abstraktů:** 15. 9. 2022

**Organizační zajištění:** HANZO Produccion, spol. s r.o.

**Kontaktní osoba:** Lucie Lapešová, +420 739 433 626, [lapesova@hanzo.cz](mailto:lapesova@hanzo.cz)

**Podrobné info a registrace:** [www.hanzo.cz/sdu](http://www.hanzo.cz/sdu)

Akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.



## Podzimní termín písemné části zkoušky FEBU

**Ve čtvrtek 17. listopadu od 14:30 do 16:30 proběhne písemná část zkoušky FEBU.**

Registrace bude spuštěna 11. září.

Bližší informace a odkaz na registraci | [ZDE](#) |.

Připomínáme, že ČUS po předložení certifikátů o vykonání písemné i ústní části zkoušky propolácí úspěšným absolventům poplatky za obě zkoušky.





# 68. výroční konference ČUS ČLS JEP

Nejvýznamnější urologická vzdělávací akce proběhne **19. – 21. října v hotelu Clarion v Olomouci.**



## Registrace

Registrace účastníků byla spuštěna 13. května. Zájemci o účast se mohou přihlásit prostřednictvím formuláře na webových stránkách ČUS | [ZDE](#) | (před prvním vstupem do registračního systému je potřeba provést registraci).

## Registrační poplatky

	Časný (do 30. 6. 2022)	Pozdní (do 3. 10. 2022)	Na místě	Společenský večer
Člen ČUS SUS	2 500,00 Kč	3 500,00 Kč	4 500,00 Kč	500,00 Kč
Zdravotnický průmysl	6 000,00 Kč	7 000,00 Kč	8 000,00 Kč	500,00 Kč
Lékař ve specializační přípravě	1 500,00 Kč	3 000,00 Kč	4 500,00 Kč	500,00 Kč
Lékař, nečlen ČUS, SUS	3 500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 500,00 Kč	500,00 Kč
Ekonomicky neaktivní (penzista, rodičovská dovolená)	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč	4 500,00 Kč	500,00 Kč
Zdravotní sestra, student LF	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč	4 500,00 Kč	500,00 Kč
Doprovod				500,00 Kč

Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH. Poplatky lze uhradit převodem, platební kartou nebo fakturou. V době konání konference budou mít registrovaní účastníci k dispozici zdarma 3-denní časovou jízdenku pro využití městské hromadné dopravy v Olomouci (tramvaje, autobusy). Jako jízdenka bude sloužit jmenovka (badge), která bude účastníkům vydávána u registrace.

**Na jízdenku budou mít nárok všichni účastníci konference, kteří se zaregistrují do 3. 10. 2022.** Pro účastníky zaregistrované po 3. 10. nebude možné časovou jízdenku zajistit.

## Ubytování

Ubytování si rezervujte současně s on-line registrací k účasti na konferenci. Ubytování v letošním roce nebude hrazeno společně s registračním poplatkem, ale každý účastník si bude ubytování hradit individuálně! Poptávka ubytování bude předána konkrétnímu ubytovacímu zařízení, které bude účastníka ohledně platby kontaktovat. Konkrétní počet nocí si rezervujte po komunikaci s recepcí konkrétního hotelu. Ubytování si prosím rezervujte co nejdříve. Rezervace ubytování jsou vyřizovány v pořadí doručených přihlášek.

## Odborný program

Odborný program 68. výroční konference ČUS bude uveřejněn v průběhu září.


## Hands-on Training kurzy

Během výroční konference budou probíhat oblíbené laparoskopické HoT kurzy, které zajišťuje Česká urologická společnost ve spolupráci s firmou Olympus.

Registrace byla zahájena **5. září**, kurzy budou obsazovány podle pořadí přihlášek, do naplnění dostupné kapacity (celkem bude k dispozici 25 míst). Přehled volných časových slotů je | [ZDE](#) |.

Pro rezervaci místa kontaktujte sekretariát ČUS: [sekr@cus.cz](mailto:sekr@cus.cz)

Další informace ke konferenci jsou dostupné na webových stránkách ČUS | [ZDE](#) |.



Vážené kolegyně a kolegové,

jsem velmi potěšen, že po dlouhé době, kdy jsme se nemohli společně potkat na větším fóru, Vás mohu konečně ve dnech 19. až 21. října 2022 pozvat na 68. výroční konferenci ČUS do Olomouce. Setkání bude prezenční, osobní, živé. Pevně věřím, že nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, která by konání akce opět zhatila.

Těšit se můžete na tradiční kongresové schéma, účast příslibili špičkoví a inspirativní odborníci z řad urologů českých, slovenských, ale i zahraničních. Nejdůležitější však bude možnost přátelského setkání široké urologické obce. Proto pevně věřím ve Vaši hojnou účast.

Kromě hodnotného a poutavého vědeckého programu si jistě najdete čas i na prohlídku podzemní Olomouce, města s dlouhou a pestrou historií. Sídla univerzity, arcibiskupství, vojenské posádky, špičkových sportovních klubů. Ucelené historické jádro, které je svou velikostí druhé největší po Praze, je plné kostelů, nádherných zákoutí i příjemných restaurací. Pokusíme se pro Vás připravit i pestré kulturní vyžití.

Přijměte tedy, prosím, pozvání do Olomouce, budeme se na Vás všechny těšit.

**Igor Hartmann**  
prezident 68. výroční konference ČUS

# JARNÍ EDUKAČNÍ UROLOGICKÉ SYMPÓZIUM 2023

21. - 22. 4. 2023 ● Dům kultury, Kroměříž



**Záštita:**

České urologické společnosti ČLS JEP  
České akademie urologie ČUS ČLS JEP

**Pořadatel:**

Česká urologická  
společnost ČLS JEP



**Organizační zajištění:**

4Education

## Česká urologie 2/2022




V červnu vyšlo druhé číslo časopisu Česká urologie.  
Prohlédnout a pročíst si ho můžete | [ZDE](#) |.




26

# Česká urologie



## CZECH UROLOGY

2022 | ročník/volume 26 | číslo/number 2 | červen | ISSN 2336-5692

Časopis České urologické společnosti ČLS JEP

# PR aktivity

## Pokračování PR kampaně Dny otevřených ambulancí

V lednu proběhla ve spolupráci ČUS, agentury MaVe PR a za podpory společnosti Astellas úspěšná kampaň Dny otevřených ambulancí, do které se zapojilo 37 urologických pracovišť z celé ČR. V červnu jsme pracoviště požádali o zpětnou vazbu, na jejímž základě vznikla tisková zpráva, která byla médiím poskytnuta začátkem prázdnin. Celkem urologové vyšetřili stovky mužů v rizikovém věku a kromě rakoviny prostaty našli u příchozích také případy rakoviny varlat, močového měchýře nebo ledvin. Akce podle lékařů vzbudila nebývalý zájem veřejnosti o vyšetření, mnohé ambulance objednávaly pacienty na týdny dopředu.

*„Zájem o Dny otevřených urologických ambulancí zdaleka překonal naše očekávání, některé ordinace braly objednané pacienty ještě v dubnu. Počty zachycených případů rakoviny ale znovu potvrzují, jak důležité je neustále veřejnost upozorňovat na potřebu prevence. Včasný záchyt rakoviny zlepšuje možnosti léčby a snižuje riziko nepříjemných a život ohrožujících následků.“* říká prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, předseda České urologické společnosti (ČUS) ČLS JEP.

Celá tisková zpráva a některé výstupy kampaně jsou k dispozici na webu ČUS, v části určené pacientům | [ZDE](#) |.



Prof. Roman Zachoval byl 26. července hostem pořadu Snídaně s Novou

## Vzpomínka na prof. MUDr. Ondřeje Hese, Ph.D.

**21. 7. 1968 – 1. 7. 2022**

Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň

Úmrtí každého člověka je vždy velmi smutná událost, ale občas zemrou lidé, kteří jsou natolik výjimeční, že člověk pláče nejen nad ztrátou této osoby, ale i nad představou, o co vše je od teď svět ochuzen. Nejsmutnější je, když dojde k úmrtí takového člověka ve vašem blízkém okolí. Právě toto se mně a mým kolegům stalo minulý týden, kdy zcela náhle a předčasně, ve věku 54 let, zemřel náš milovaný kolega, prof. MUDr. Ondřej Hes. Byl jedním z těch lidí, který, ač byl ve svém oboru (týkající se zejména diagnostiky a klasifikace nádorů ledvin) naprostou světovou extratřídou, zůstal širší veřejnosti neznámý. Jeho rutinní diagnostická práce v roli chirurgického patologa pomáhala správně léčit desítky tisíc pacientů v Čechách i ve světě, výsledky jeho zcela fenomenální vědecké činnosti (mj. v Plzni vybudoval pravděpodobně největší registr vzácných ledvinných nádorů na světě) budou již navždy zachraňovat nebo výrazně zlepšovat životy ještě daleko většího počtu lidí. Velkou část svého času věnoval výuce studentů medicíny, jichž mu rukama prošlo mnoho tisíc.

Každoročně za ním do Plzně jezdilo mnoho převážně mladých patologů z celého světa zdokonalit se v diagnostice nádorů ledvin a využít šance spolupracovat s Ondrou na vědeckých projektech. Mimo svoji profesionální kariéru lékaře byl Ondra velkým znalcem a velmi aktivním ochráncem zvířat a přírody a spolu se svými přáteli má na svědomí vznik a rozvoj desítek hektarů mokřadů a dalších unikátních biotopů v našem okolí (více mj. zde: <https://fondeden.cz/>). V mládí vrcholově sportoval (lehká atletika) a špičkovým sportovcem zůstal až do poslední minuty svého aktivního života ve zcela ojedinělé fyzické kondici. A především byl naprosto jedinečný lidsky, neustále vtipkující, vychechtaný a připravený komukoliv pomoci. Nikoho takového druhého neznám.

Tento příspěvek píšu i proto, abych nám všem připomněl, že většina těch nejlepších lidí se neprodukuje před kamerou a nenajdete je na stránkách Blesku. Naopak, tyto lidé obvykle žijí své životy celkem skrytě. Bez nich by naše společnost nestála za nic. Teď jen doufám, že i bez Ondry jich mezi námi zůstane ještě dost. Odpočivej v pokoji Ondro.

V Plzni 5. 7. 2022



prof. MUDr. Michal Michal  
Šiklův ústav patologie, LF UK a FN Plzeň  
Bioptická laboratoř s.r.o., Plzeň

# Děkujeme

za podporu  
partnerům ČUS

Platinový partner



Stříbrní partneři



Bronzoví partneři



**BERLIN-CHEMIE**  
MENARINI

**B|BRAUN**  
SHARING EXPERTISE



Oficiální partner



Heaton

