

Adamcová V. ¹, Stejskal J. ¹, Zachoval R. ¹

¹ Urologická klinika 3.LF a Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Cíle

Prospektivně zhodnotit stresovou inkontinenci u pacientů, kteří postoupili laparoskopickou radikální prostatektomií (LARP) na našem pracovišti pomocí dotazníků hodnotících subjektivní obtíže pacientů.


Metodika

Celkově bylo do studie zahrnuto 66 pacientů, kteří splnili následující inkluzní kritéria: LARP na našem pracovišti mezi únorem 2019 a červnem 2021, lokalizovaný karcinom prostaty v době diagnózy, souhlas se zařazením do studie, kompletní data po 12 měsících a absence indikace adjuvantní radioterapie. Kompletní data po 24 měsících od operace byla vyhodnocena u 37 pacientů. Vyhodnoceny byly výsledky udávané pacienty do standardizovaného dotazníku "The expanded prostate cancer index composite-26 short form (EPIC-26)" jeden den před LARP a následně 12 a 24 měsíců po operaci. Hodnocení bylo provedeno v rámci studie „Prostate cancer outcomes global initiative to compare and reduce variation in localised prostate cancer“, která je sponzorována Movember Foundation. Do této studie jsou zapojeno více jak 300 pracovišť z celého světa. Z vyplněných dat byla provedena analýza denního počtu používaných vložek před a po LARP.

Výsledky

Průměrný věku pacientů byl 64 let (51-78), průměrně PSA před LARP 8,14 ng/ml (3,00-21,90), medián ISUP GG stupně z LARP byl 3. V definitivním preparátu LARP byl u 54 pacientů popsán karcinom prostaty stadia pT2 a u 12 pacientů stadia pT3. Všichni sledovaní pacienti byli v hodnoceném období bez biochemické progresse. Maximálně jednu vložku denně 12 respektive 24 měsíců od operace potřebovalo 74,24 %, respektive 89,19 % pacientů. Podrobné výsledky počtu vložek jsou prezentovány v tabulce níže.

	Před operací	12 měsíců po operaci	24 měsíců po operaci
0 vložek	63 95,45%	33 50%	18 48,65%
1 vložka	2 3,03%	16 24,24%	15 40,54%
2 vložky	1 1,52%	14 21,21%	4 10,81%
3 a více vložek	0 0%	3 4,55%	0 0%



Závěr

Zpětná vazba pomocí subjektivního hodnocení pacientů je užitečný nástroj při sledování funkčních výsledků po LARP. Po 12 a 24 měsících nepotřebovalo inkontinenční vložky 50 % respektive 48,65 % pacientů. Ke zlepšení stresové inkontinence po LARP může u některých pacientů docházet i déle než rok od operace. Výsledky našeho pracoviště jsou statisticky zpracovávány a pohybují se v rámci celosvětového průměru.